




ANILHA		CONTROLO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		COORDENADAS		DATA		HORA		MUDA ACTIVA SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ANILHADORES DE AVES 					
LOCAL			ESPÉCIE				IDADE		SEXO		REGISTO DE DADOS ESPECIAL SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>						
ASA	PESO	8ª PRIMÁRIA	GORDURA	OSSFIFICAÇÃO	MÚSCULO	TARSO	BICO	ANILHADOR		ASSIMÉTRICA SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>							
			TIPO DE MUDA														
			VERÃO														
			INVERNO														
			PRINCÍPIO DO INVERNO														
			FINAL DO INVERNO														
			0 MAIS ANTIGA QUE														
			TERCIÁRIAS			SECUNDÁRIAS				PRIMÁRIAS							
D																	
E																	
			9 8 7 6 5 4 3 2 1			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
			GRANDES COBERTURAS					COB		COBERTURAS PRIMÁRIAS							
D																	
E																	
			10 9 8 7 6 5 4 3 2 1					CAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9									
			METADE ESQUERDA DA CAUDA					METADE DIREITA DA CAUDA									
NOTAS													PENAS DO CORPO				
													CAB PI PS CPE CME ESC CSC CIC				
													% CRES.				
													% NOV.				
													%?....				
FICHA ADICIONAL <input type="checkbox"/>																	

INSTRUÇÕES

Tipos de Muda

VERÃO - Muda pós-nupcial ou pós juvenil (por definição, em aves migradoras, é a muda que tem lugar antes da passagem Outonal).

INVERNO - Muda pré-nupcial (em aves migradoras, a muda tem lugar depois da passagem Outonal e antes da passagem Primavera).l).

PRINCIPIO DO INVERNO - Muda pré-nupcial que tem lugar no Outono (p. ex. Outubro - Novembro).

FINAL DO INVERNO - Muda pré-nupcial que tem lugar no final do Inverno.

Código para as penas em muda activa (excepto penas do corpo)

- 0 Pena velha (de uma geração anterior).
- 1 Pena ausente ou uma nova que ainda não emergiu do canudo.
- 2 Pena em crescimento a emergir do canudo ou que já cresceu até 1/3 do comprimento total.
- 3 Pena em crescimento entre 1/3 e 2/3 do crescimento total.
- 4 Pena em crescimento desde 2/3 até alcançar o comprimento total.
- 5 Pena nova totalmente desenvolvida, sem vestígios do canudo na base.
- 9 Impossível de determinar.

A classificação para a ossificação do crânio é a de 7 fases proposta por Jenni & Winkler (1994).

A classificação para a gordura é a de 9 fases proposta por Kaiser (1993).

Esta ficha foi baseada no modelo espanhol (SEO)

Código para as penas do corpo em muda activa

CAB - Penas da cabeça.

PI - Partes inferiores. Abarca todas as partes inferiores com penas excepto as infracaudais.

PS - Partes superiores. Inclui todas as áreas do dorso da ave, excepto as supracaudais e escapulares.

CPE - Coberturas pequenas.

CME - Coberturas médias.

ESC - Escapulares.

CSC - Coberturas supracaudais.

CIC - Coberturas infracaudais.

Para cada zona deve ser estimada uma percentagem:

%CRES. - Percentagem de penas que estão a crescer (não se incluem as que já finalizaram o crescimento).

%NOV. - Percentagem de penas novas (cuja muda já tenha finalizado, ou estão totalmente desenvolvidas sem vestígios de canudo na base, ; não se incluem as penas em crescimento inseridas no parâmetro anterior).

0	0%	3	Entre 31 e 60%
1	Entre 1 e 10%	4	Entre 61 e 90%
2	Entre 11 e 30%	5	Mais de 90%

Código para as penas em muda não activa (excepto penas do corpo)

- 4 Pena em crescimento.
- 5 Pena crescida durante a muda de "Verão" anterior ou em curso.
- 6 Crescida durante a muda de "Inverno" anterior ou em curso.
- 7 Crescida durante a muda de "Princípio de Inverno" anterior ou em curso.
- 8 Crescida durante a muda de "Final de Inverno" anterior ou em curso.
- 9 Impossível de determinar.
- 0 Pena de geração desconhecida, mas anterior a qualquer outro número designado na ficha. Na casa " Q MAIS ANTIGA QUE" deve designar-se o número de código de muda ao qual o Q é antecedente.
- 1 Pena juvenil.
- 2 Crescida no "Verão" anterior ás penas designadas como 5.
- 3 Crescida no "Inverno" anterior ás penas designadas com os números 6 - 8.